LES ZONOSSES : PATHOLOGIES LIEES A

LA PRESENCE D'UN ANIMAL

I) DEFINITION

OMS (1959) – Union européenne (1992)

Les zoonoses sont les maladies et infections qui se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa.

Exemple : le paludisme (arthropode > homme) **N'**est **PAS** une zoonose.

Deux évènements qui ont modifié la définition

SIDA : contamination animale ?

Etude phylogénétique des types de HIV 1 et 2

Origine animal de la maladie (homme et chimpanzé). Maladie historiquement animale mais de contamination humaine.

Consommation de viande contaminée ?

- Salmonelle multi résistantes dans la chaîne alimentaire
- Listériose
- Encéphalopathie spongiforme (esb)

Notion de transmissibilité pour une zoonose :

- Pas les envenimations
- Pas les allergies
- Pas les intoxications
- Pas les maladies communes aux animaux
 - o Notamment celles à réservoir tellurique comme le tétanos.
- Pas les animaux invertébrés
 - o Pas le paludisme transmis par l'anophèle car pas d'autres mammifères contaminés

II) REGLEMENTATION EUROPEENNE.

Directive 2003/99/CE du parlement européen sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques définit :

1. Zoonoses et agents zoonotiques à surveiller

- Brucellose (bactérie brucella)
- Campylobactériose (bactérie campylobacter)
- Echinococcose (echinococcus)
- Listériose
- Salmonellose
- Trichinellose
- Tuberculose
- Escherichia coli vérotoxigéniques

2. Liste des zoonoses et agents zoonotiques à surveiller en fonction de la situation épidémiologique en Europe

- Calicivirus
- Virus de l'hépatite A
- Virus de la grippe
- Rage
- Arbovirus : virus transmis par les arthropodes

1. Zoonoses virales

- Borréliose
- Botulisme
- Leptospirose
- Psittacose
- Tuberculose autre que *M.bovis*
- Vibriose
- Yersiniose

2. Zoonoses bactériennes

- Anisakiase
- Cryptosporidiose
- Cysticercose
- Toxoplasmose

3. Zoonoses parasitaires

En plus : avis personnel hors directive

- Dermatophytes

4 Zoonoses fongiques

3. Modes de contamination

Zoonoses transmises par :

- Contact avec l'animal
- Contact avec les déjections
- Transmission par un arthropode
- Ingestion de viande ou de lait cru
- Griffures ou morsures
 - o Rage
 - o Maladie des griffes du chat
 - o Pasteurellose.

III) LES ZOONOSES PAR CONTACT : LES TEIGNES

1. Dermatophytes zoonotiques

Chez la plupart des animaux sauvages et domestiques. Sont très contagieuses entre animaux, ainsi que de l'animal à l'homme. Certaines dermatophytoses sont contagieuses d'homme à hommes, mais ce ne sont pas des formes zoonotiques.

L'enfant est particulièrement exposé, ainsi que le zoophile :

- Contact plus étroit avec l'animal
- Surtout si l'animal est jeune.

Dermatophytes zoonotiques les plus fréquents :

- *Microsporum canis*
- *Trichophyton mentagrophytes* : animaux d'élevage (bovins)

2. Manifestations cliniques chez l'animal.

Diagnostic : Difficile, d'autant plus qu'il existe des porteurs sains (persan, cobaye...)

Transmission :

- Par contact direct avec l'animal
- Par contact indirect (poils sont contagieux 3 à 6 mois)

Symptômes : Dépilations rondes, à bords nets

Traiter l'animal, ses congénères et le milieu environnant.

3. Manifestations cliniques chez l'homme.

Au début : petites plaques squameuses

Après 3 semaines :

- **Herpès circiné** : plaque érythémateuse squameuse arrondie avec poils cassés.

- **Localisation au niveau du cuir chevelu (cheveux cassés)**

- o Teignes sèches

- o Teignes inflammatoires et suppurées.

IV) ZOONOSE TRANSMISE PAR LES DEJECTIONS

L'échinocoque : petit ténia parasite intestinal des canidés.

1. Hydatitose à echinococcus granulosus

Anthropozoonose cosmopolite : régions d'élevage de moutons transhumants

- En France : Landes, Pays-Basque, Provence, Corse
- Afrique du nord : Tunisie (15/100 000) et Maroc (7,2 / 100 000)

2. Echinococcose alvéolaire à *E. Granulosus*

Transmission par ingestion de végétaux souillés par des déjections de renard, chien, chat ou par contacts.

Larve polyvésiculaire

- ▶ cuticule discontinue
- ▶ Infiltrations de la membrane
- ▶ nécrose hépatique

Hydatide alvéolaire

Renards infestés en périphéries de Nancy :

- 20% en 1980
- 54% en 2010

Et 5% sur l'agglomération

a. La clinique de l'échinococcose alvéolaire

- Phases d'incubation et d'invasion longues (10 à 15 ans)
- Les manifestations cliniques sont liées
 - A l'existence de lésions volumineuses
 - À la compression de structures vasculaires ou biliaires
- 3 principales manifestations :
 - **Ictère**, avec prurit, urines foncées et selles décolorées.
 - **Hépatomégalie** dure, irrégulière.
- Complications
 - Rupture du kyste dans les voies biliaires
 - Extensions aux organes voisins :
 - Métastases pulmonaires (20% des cas),
 - Métastases cérébrales (5% des cas)

b. Le traitement et la prévention de l'échinococcose alvéolaire

Traitement

- Chirurgie des lésions localisées :
 - Hépatectomie
 - Surveillance d'éventuelles récurrences pendant 10 ans
 - Transplantation hépatique si atteinte hépatique grave
- Traitement médical :
 - Albendazole (Zentel®) pendant 10 ans
 - 50% des patients répondent au traitement
 - taux de survie de 50 à 80% à 15 ans.

Prévention

- Lavage des légumes et cuisson des aliments
- Vermifugation régulière des animaux domestiques (praziquantel) et destruction des déjections

3. La toxoplasmose.

Protozoaire intracellulaire strict (sporozoaire) : *toxoplasma gondii*

Personnes à risque :

- Femmes enceintes
- Personnes immunodéprimées.

a. Séroprévalence de la toxoplasmose en France

Diminue régulièrement depuis 30 ans

Actuellement, 50% des adultes immunisés (qui a été contaminée)

b. Le cycle évolutif

• Parasite intestinal du chat.

- **Oocystes** : dans le sol, ingérés par les oiseaux ou les mammifères.
- **Contamination puis multiplication du parasite.**
 - Réponse immunitaire
 - Formation de kystes.

• **Chez l'homme :**

Contamination par ingestion d'oocyste dans le sol, de kystes.
Colonisation et multiplication dans le sang et différents organes : réponse immunitaire, formation de kystes (œil, cerveau, muscle)

c. La transmission.

● Ingestion d'oocystes murs telluriques

- Eau, aliments, mains
- Litière du chat : 2% sont porteurs (jeunes)

● Ingestion de kystes

- Vivants dans de la viande crue ou insuffisamment cuite
- 60-80% des moutons et chèvres parasités.
- 5-30% pour le boeuf et porc
- Volaille : moins fréquent

● Passage transplacentaire

- Femme enceinte non immunisée
- Infestation du fœtus après 4 à 8 semaines
- Risque estimé à 30%

● Transmission

- Par greffe d'organe
- Transfusion sanguine

d. Morphologie et biologie du parasite

● Tachyzoïte 5-10 μm

- Endocellulaire : macrophage
- Responsable des lésions cliniques
- Extracytoplasmique (vacuole parasitophore)
 - Formation en qq secondes par le parasite
 - Multiplication du parasite asexuée rapide
 - Protection contre les enzymes et les antibiotiques

● Bradyzoïtes

- Structure voisine
- Multiplication asexuée + lente
- Forme latente dans des kystes
- 2000 à 3000 bradyzoïtes/kyste de 100 μm

● Oocystes 10x15 μm

- Résultat de la reproduction sexuée chez le chat
- Forme de dissémination dans le milieu extérieur

e. Réactions de défense de l'hôte

Phase n°1 : phase de parasitémie (10 jours) :

- Après la contamination
- Pénétration et multiplication dans les phagocytes mononucléés
- Passage dans le système sanguin et lymphatique

Phase n°2 : mise en place de l'immunité cellulaire

- **Immunité cellulaire**
 - Activation des lymphocytes T par les antigènes
 - Stimulation des macrophages parasités par l'intermédiaire des cytokines
 - Destruction des parasites qui survivent dans d'autres cellules (cellules musculaires en particulier)
- **Immunité humorale :**
 - Sécrétion des anticorps par les plasmocytes : igm, puis igg
 - Lysent des parasites «libres»
 - Neutralisent le pouvoir inhibiteur des toxoplasmes sur le métabolisme des macrophages
 - Peu présents dans certaines cellules (œil, cerveau)

Phase n°3 : phase de toxoplasmose chronique.

- Multiplication et blocage des trophozoïtes (appelés bradyzoïtes) dans des cellules.
- État de quiescence : formation de "kystes" (muscle, œil et SNC)

f. La clinique

• Toxoplasmose acquise de l'immunocompétent

- **Asymptomatique (80% des cas)**
- **Formes symptomatiques**
 - Fièvre prolongée (38C)
 - Adénopathies cervicales
 - Asthénie
 - Spontanément résolutif
 - À différencier de la mononucléose infectieuse
- **Conséquences :**
 - Kystes latents → réactivations
 - Immunité acquise : igg décelables

• Toxoplasmose congénitale

Colonisation du placenta pendant la phase septicémique :

→ Contamination fœtale par passage transplacentaire si la contamination de la mère survient en cours de grossesse

→ Transmission materno-foetale de 25% lors d'une séroconversion

- ▶ 70% ont une atteinte infraclinique,
- ▶ 25% ont une forme légère, surtout oculaire
- ▶ < 5% ont une forme grave

800 000 grossesses/an
 ↓ 50%
 400 000 femmes séro-négatives non immunisées
 ↓ 0,5%
 2 000 séro-conversions
 ↓ 25%
 240 contaminations fœtales
 (1 enfant/3200 en 2008)

Aspects cliniques observés chez le fœtus

- ▶ si la contamination est précoce
 - ▶ mort *in utero*
 - ▶ modifications de l'aspect et du volume du crâne
 - ▶ hydrocéphalie, macrocéphalie, dilatation ventriculaire
 - ▶ calcifications intracrâniennes
 - ▶ signes neurologiques
 - ▶ chorioretinite
- ▶ si la contamination est plus tardive : forme viscérale
 - ▶ ictère néo-natal
 - ▶ hépato-splénomégalie
 - ▶ atteintes digestives...

calcifications intracrâniennes (Anofel)

- ▶ Toxoplasmose congénitale bénigne :
 - ▶ chorioretinite
 - ▶ forme neurologique : crises convulsives
 - ▶ retard psychomoteur
 - ▶ augmentation du périmètre crânien
- ▶ Toxoplasmose congénitale latente : 80% des cas
 - ▶ enfant indemne à la naissance mais porteur d'IgM
 - ▶ risque de lésions oculaires après quelques années