REGULATION DES BATTEMENTS CARDIAQUES

I) Les éléments du contrôle nerveux de la fréquence cardiaque.

1. Généralités.

Les cibles : Nœud sinusal et nœud atrio-ventriculaire.

Au repos : double activité tonique efférente sympathique et parasympathique.

Propanolol → bradycardie ±

Atropine → tachycardie +++

L'effet inhibiteur du parasympathique prédomine.

2. Le sympathique a des effets facilitateurs.

Cible = le nœud sinusal. La noradrénaline cible des récepteurs β_1

- **Agoniste** : isoprotérénol (isuprel)
- **Antagoniste** : propranolol

Cinétique lente :

Début progressif : libération lente de noradrénaline $\rightarrow$ action via un 2nd messenger adényl-cyclase.

Arrêt progressif : recapture de noradrénaline par les terminaisons nerveuses (« lavage circulatoire »)

Fréquence cardiaque en réponse à la stimulation électrique des nerfs sympathiques et parasympathiques du cœur.

I_{Ca} , I_{Na} augmentent beaucoup plus rapidement que I_K .

Dépolarisation plus rapide

Modes d'action du SNA

STIMULATION SYMPATHIQUE à la NORADRENALINE sur les récepteurs β_1

$\rightarrow$ Dépolarisation $\rightarrow$ augmentation de la fréquence cardiaque.

3. Le parasymphatique a des effets inhibiteurs

Cible = nœud sinusal ET nœud atrio-ventriculaire. L'acétylcholine se fixe sur des récepteurs muscariniques (M2)

- **antagoniste** : l'atropine

Distribution asymétrique :

- **Parasympathique droit** → nœud sinusal → bradycardie
- **Parasympathique gauche** → nœud A-V → bloc de conduction

Cinétique rapide :

- **Délai d'action rapide** (<100 ms) :
 - o ouverture de canaux K^+ acétylcholine dépendants (pas de 2nd messenger)
- **Arrêt brutal**
 - o Hydrolyse rapide de l'acétylcholine (acétylcholinestérase musculaire +++)

Réponse dynamique idéale pour la régulation cycle à cycle de la fréquence cardiaque.

Augmentation de l'activité des canaux K^+ acétylcholine dépendants.

Mode d'action du SNA : STIMULATION PARASYMPATHIQUE
l'ACÉTYLCHOLINE se fixe sur des récepteurs MUSCARINIQUES
→ Dépolarisation lente → Baisse de la fréquence cardiaque.

Mode d'action du SNA	Méiateur	Récepteur	Action	Vitesse de dépolariation	Changement de fréquence cardiaque
SYMPATHIQUE	Noradrénaline	BETA 1	Ouverture des canaux calcium et sodium	Rapide	Augmentation = Tachycardie
PARASYMPATHIQUE	Acétylcholine	Muscariniques	Ouverture des canaux potassium	Lente	Diminution = Bradycardie

II) Modulation de l'activité du nœud sinusal par la respiration

Augmentation de la fréquence cardiaque pendant l'inspiration chez l'enfant.

Activité des nerfs cardiaques efférents.

Sympathique :

- augmente la décharge à l'inspiration
- MAIS délai d'action et délai d'arrêt.
- Effet amorti.

Parasympathique :

- Augmentation de la décharge à l'expiration
- Effet instantané (<100 msec)
- Diminution fréquence du nœud sinusal.

III) Pression artérielle et baroréflexe.

Une augmentation de la pression artérielle stimule des **barorécepteurs artériels** qui envoient des messages afférents aux centres cardiovasculaires qui à leur tour stimulent le cœur par la **voie parasympathique** (message efférent) pour provoquer une **bradycardie**.

IV) Réflexe de plongée

1. Description

C'est un réflexe de protection qui survient lors d'une immersion dans l'eau froide.

Réponse somatique : Apnée

→ Asphyxie (protéger les voies aériennes pour éviter la noyade)

Réponse viscérale : Ajustements cardio-circulatoires.

→ Lutte contre le froid

→ Préserver l'apport d'O₂ aux organes vitaux

2. Stimuli et voie afférente.

STIMULUS	VOIE AFFERENTE
Eau froide	Thermorécepteur du froid (visage)
Apnée : arrêt des mouvements respiratoires	Mécanorécepteurs (thorax, poumon, diaphragme)
Apnée : Asphyxie (hypoxémie + hypercapnie)	Chémorécepteurs (artères)

3. Voie efférente et réponse.

4. Mécanisme d'adaptation fœtale à la baisse d'oxygénation placentaire

a. Réponse physiologique au cours du travail.

Contractions utérines :

- Diminution du débit utérin et placentaire.
- Diminution de l'apport en O₂ fœtal
- Réponse = redistribution du sang vers le cœur et le cerveau + bradycardie fœtale

b. souffrance fœtale par insuffisance utéro placentaire

AIGÛE : exemple → procidence du cordon.

- Asphyxie +++
- Bradycardie fœtale intense et prolongée après les contractions utérines.

CHRONIQUE : exemple : toxémie gravidique

- Redistribution sanguine chronique
- La circulation cérébrale est privilégiée.
- Aspect « dysmature » caractéristique du nouveau-né (maigre avec une grosse tête, celui de droite)

5. Variante : réflexe laryngé

Stimulation laryngée expérimentale

- Eau distillée
- Osmorécepteurs

Apnée : protection des voies aériennes.

- Asphyxie
- Bradycardie et redistribution du sang vers le cœur et le cerveau.

Reflux gastro-oesophagiens, malaises graves, et mort subite du nourrisson.